


Segregarea acului de seringă sau de alte dispozitive injectabile

Segregarea sigură a acului de seringă sau alte dispozitive pentru injectare este necesară pentru a preveni riscul lucrătorilor medicali de a se înțepa.

Segregarea acului trebuie efectuată în imediata apropiere de recipientul pentru deșuri tăietoare-înțepătoare, unde trebuie aruncat imediat.

NU îmbrăcați acul cu două mâini!!!



NU segregați seringă utilizată neprotejată/nerecapișonată cu mâna.


În cazurile excepționale, când este necesară segregarea manuală, recapișonați acul cu ajutorul UNII MÂINI, după care segregați acul cu ajutorul cleștilor.

Procedura recapișonării acului cu ajutorul UNII MÂINI:

1. Puneți protectorul de ac pe masa de lucru;
2. Cu ajutorul UNII MÂINI introduceți vârful acului în protector;
3. Ridicați vertical seringă cu ac și protectorul îmbrăcat și doar ulterior fixați definitiv protectorul;



4. După îmbrăcarea protectorului de ac dezinfecțați suprafața utilizată. Utilizați dispozitive pentru segregarea acului de seringă!!!



Respectați cerințele privind utilizarea/incărcarea recipientelor pentru deșuri tăietoare-înțepătoare



Cum dezinfectăm mainile?

O BUNA IGIENA IMPLICA DEZINFECTIA! IN PREALABIL, SPALATI MAINILE DACA SUNT VIZIBIL MURDARE

Durata întregii proceduri: 20-30 secunde



Anexa nr.4

Primul ajutor în caz de expunere

Leziuni și expuneri		Primul ajutor
Lezarea prin înțepare cu acul sau alt obiect ascuțit		☐ Spălați imediat zona lezată cu apă și săpun. ☐ NU opriți hemoragia din țesutul lezată.
Stropirea/contactarea tegumentelor lezate cu sânge și/sau alte fluide biologice		- Imediat spălați cu apă și săpun. - NU aplicați antiseptic/dezinfectant. - NU frecați locul lezată.
Stropirea/contactarea ochilor cu sânge și/sau alte fluide biologice		Imediat spălați ochii cu apă potabilă sau soluție fiziologică nu mai puțin de 15 minute. Ochii trebuie să fie deschiși, iar pleoapele ușor ridicate
Stropirea în nas și/sau în gură cu sânge sau alte fluide biologice		- Imediat scuipați sângele sau fluidul biologic și clătiți gura cu apă de câteva ori. - Expirați prin nas și spălați-l cu apă sau soluție fiziologică. - NU aplicați antiseptic/dezinfectant.
Stropirea/contactul tegumentelor intacte cu sânge sau alte fluide biologice		☐ Imediat clătiți cu apă și săpun. NU frecați locul

SCALA DE INTENSITATE A DUREII

